

(Regafib®) Regorafenib

اشکال دارویی: قرص خوراکی (40 میلی گرم)

دسته دارویی: مهارکننده تیروزین کیناز

دسته فارماکولوژیک: مهارکننده‌های چندگانه تیروزین کیناز (VEGFR, PDGFR, FGFR)

نحوه مصرف: بهتر است در زمان مشخصی از روز و پس از مصرف یک وعده غذای کم چرب (کمتر از 600 کالری و 30% چربی) مصرف شود. معمولاً به صورت 160 میلی گرم روزانه در دوره‌های درمانی 4 هفته‌ای (سه هفته مصرف یک هفته استراحت) مصرف می‌شود.

موارد مصرف:

- سرطان کولورکتال متاستاتیک
- تومور استرومایی گوارشی (GIST): پیشرفته یا غیر قابل جراحی
- کارسینوم سلول کبدی (HCC)

مزایای رقابتی:

رگورافنیب یک مهارکننده قوی چندگانه تیروزین کیناز است که به‌ویژه در مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و مسیرهای مرتبط با رشد و تکثیر سلولی نقش دارد. این دارو به‌عنوان یکی از درمان‌های خط دوم در سرطان‌های مقاوم به درمان، از جمله سرطان کولورکتال متاستاتیک، تومورهای استرومایی گوارشی و سرطان هیپاتوسلولار، استفاده می‌شود. رگورافنیب با اثربخشی بالا و توانایی کنترل پیشرفت بیماری در بیماران مقاوم به درمان‌های دیگر، انتخاب مناسبی برای متخصصان محسوب می‌شود.

