

## (Baratent®) Sunitinib

**اشکال دارویی:** کپسول خوراکی (25، 50 میلی‌گرم)

**دسته دارویی:** مهارکننده چنگانه تیروزین کیناز و مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)

**نحوه مصرف:** دوز دارو بر اساس نوع بیماری متفاوت است. در برخی از موارد مصرف دوزهای مداوم روزانه نیاز است و برخی دیگر شامل دوره‌های درمانی 6 هفته‌ای (4 هفته مصرف، 2 هفته استراحت). مصرف با یا بدون غذا امکان‌پذیر است.

### موارد مصرف:

- کارسینوم سلول کلیوی (RCC): درمان خط اول در بیماران با RCC پیشرفته یا متاستاتیک.
- تومور استرومایی گوارشی (GIST): خط دوم درمان در بیمارانی که به ایماتینیب مقاوم شده‌اند یا تحمل نمی‌کنند.
- تومورهای نورواندوکرینی پانکراس پیشرفته

### مزایای رقابتی:

سانیتینیب به‌عنوان یکی از مهارکننده‌های چنگانه تیروزین کیناز، به‌ویژه با مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و سایر مسیرهای مهم، به‌طور مؤثری در درمان سرطان‌های پیشرفته نظیر RCC، GIST و تومورهای نورواندوکرینی پانکراس کاربرد دارد. این دارو به دلیل قابلیت مهار چنگانه مسیرهای مرتبط با رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی، به یک انتخاب اصلی در درمان بیماران مقاوم به درمان‌های قبلی تبدیل شده است. سونیتینیب با نتایج بالینی مثبت در کنترل بیماری و افزایش بقا، جایگاه ویژه‌ای در درمان سرطان‌های پیشرفته دارد.

