

(Oncocap®) Capecitabine

اشکال دارویی: قرص خوراکی 500 میلی گرمی

دسته دارویی: آنالوگ‌های پیریمیدین / آنتی‌متابولیت‌ها (Pyrimidine analogues – Antimetabolites)

نحوه مصرف: روزانه در فواصل 12 ساعته و در ساعات مشخص مصرف شود. تا نیم ساعت پس از غذا همراه با غذا به طور کامل بلعیده شود.

موارد مصرف:

- سرطان کولورکتال (در مراحل مختلف متاستاتیک، استیج III پس از جراحی (ادجوانت تراپی) و یا پیش از جراحی)
- سرطان سینه متاستاتیک یا پیشرفته (Metastatic or advanced breast cancer)
- سرطان مری و معده (gastroesophageal)
- سرطان پانکراس (ادجوانت تراپی)

مزایای رقابتی:

Capecitabine به صورت خوراکی مصرف می‌شود، که این ویژگی باعث راحتی بیشتر بیمار، کاهش نیاز به بستری و افزایش کیفیت زندگی می‌شود. این دارو در بدن به طور انتخابی در بافت‌های توموری به FU-5 فعال تبدیل می‌شود، که منجر به افزایش اثربخشی و کاهش عوارض سیستمیک می‌گردد. همچنین امکان مصرف در منزل را فراهم می‌کند و نیاز به وسایل تزریقی یا پمپ‌های مداوم را از بین می‌برد. قابلیت ترکیب راحت‌تر با سایر داروهای خوراکی و تزریقی نیز یکی دیگر از مزایای آن است.

