

(Zanker®) Cabozantinib

اشکال دارویی: قرص خوراکی (20، 40، 60 میلی‌گرم)

دسته دارویی: مهارکننده چنگانه تیروزین کیناز و مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)

نحوه مصرف: یک بار در روز، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود. مصرف دارو با معده خالی به کاهش عوارض گوارشی کمک می‌کند.

موارد مصرف:

• کارسینوم سلول کلیوی (RCC):

• درمان ترکیبی خط اول با نپولوماب در بیماران مبتلا به RCC پیشرفته.

• درمان خط دوم در بیماران با پیشرفت بیماری پس از درمان‌های VEGFR یا ایمونوتراپی.

• سرطان تیروئید مدولاری (MTC): پیشرفته غیرقابل جراحی یا متاستاتیک.

• سرطان تیروئید تمایز یافته (DTC): پیشرفته یا متاستاتیک

• کارسینوم سلول کبدی (HCC): در بیمارانی که پس از دریافت سورافنیتیب یا دیگر داروهای خط اول پیشرفت کرده‌اند.

مزایای رقابتی:

کابوزانتینیب به‌عنوان یک مهارکننده چنگانه تیروزین کیناز، قدرت بالایی در کنترل تومورهای مقاوم به درمان‌های متداول نشان داده است. این دارو از طریق مهار مسیرهای MET، و AXL، نه تنها رشد تومورها را متوقف می‌کند بلکه از عروق‌سازی و متاستاز سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند. در مطالعات بالینی، کابوزانتینیب باعث افزایش قابل‌توجه بقای بدون پیشرفت بیماری (PFS) در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول‌های کلیوی و سرطان تیروئید مدولاری به خصوص در بیماران با تومورهای پیشرفته که دیگر داروها توان کنترل آنها را ندارند شده است. این مزایا کابوزانتینیب را به یک انتخاب برتر برای متخصصین جهان تبدیل کرده است که به دنبال راه‌حلی مؤثر و پایدار برای سرطان‌های مقاوم هستند.

