

(Matinab®) Imatinib

اشکال دارویی: قرص خوراکی (100 میلی گرم)

دسته دارویی: مهارکننده تیروزین کیناز

نحوه مصرف:

دارو همراه با غذا و یک لیوان آب برای کاهش تحریک گوارشی مصرف شود. توصیه می‌گردد دوزهای روزانه بالاتر از 800 میلی گرم باید به صورت دو دوز منقسم مصرف شوند. در صورت نیاز، قرص‌ها را می‌توان در آب حل کرده و بلافاصله مصرف نمود.

موارد مصرف:

- لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) فیلادلفیا مثبت (Ph+)
- لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) فیلادلفیا مثبت (Ph+)
- تومورهای استرومایی گوارشی (GIST)
- پس از جراحی
- غیر قابل جراحی و یا متاستاز دهنده بدخیم

- بیماری (Myelodysplastic/Myeloproliferative) با بازآرایی ژن PDGFR
- سندروم هایپرئاوژینوفیلیک (HES) یا لوسمی مزمن ائوزینوفیلیک (CEL)
- درماتوفیبروسارکوما پروتوبرنس (Dermatofibrosarcoma protuberance)
- ماستوسیتوز سیستمی تهاجمی (Aggressive Systemic Macrocystosis)

مزایای رقابتی:

ایماتینیب، به عنوان اولین مهارکننده تیروزین کیناز BCR-ABL، انقلاب بزرگی در درمان لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و تومورهای استرومایی گوارشی (GIST) به ارمغان آورده است. این دارو نه تنها پیشرفت بیماری را به طور قابل توجهی متوقف می‌کند بلکه باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران نیز می‌شود.

