

(Banolib®) Nilotinib

اشکال دارویی: کپسول خوراکی (150، 200 میلی گرم)

دسته دارویی: مهارکننده تیروزین کیناز

نحوه مصرف:

دو بار در روز با فاصله 12 ساعت، بهتر است با معده خالی مصرف شود (حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا).

موارد مصرف:

- لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) فیلادلفیا مثبت تازه تشخیص داده شده، مقاوم به درمان قبلی
- لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) فیلادلفیا مثبت، مقاوم یا عودکننده
- تومور استرومایی گوارشی (GIST) مقاوم به درمان

مزایای رقابتی:

نیلوتینیب به عنوان یک مهارکننده تیروزین کیناز با اثربخشی بالاتر نسبت به ایماتینیب، به ویژه در بیماران مقاوم به درمان های قبلی، نتایج بالینی بی نظیری ارائه داده است. نیلوتینیب با مهار دقیق تر مسیر BCR-ABL، نه تنها سرعت پیشرفت بیماری را کاهش می دهد بلکه خطر مقاومت دارویی را نیز به حداقل می رساند. نیلوتینیب به دلیل اثربخشی بالا و پروفایل ایمنی بهتر نسبت به دیگر مهارکننده های تیروزین کیناز، انتخابی مناسب برای بیماران مبتلا به CML است.

