

(Palborain®) Palbociclib

اشکال دارویی: کپسول خوراکی (75، 100، 125 میلی گرم)

دسته دارویی: مهارکننده چرخه سلولی

دسته فارماکولوژیک: مهارکننده CDK4/6 (Cyclin-Dependent Kinases)

نحوه مصرف:

معمولا به صورت 125 میلی گرم روزانه در دوره های درمانی 4 هفته ایی (سه هفته مصرف یک هفته استراحت) مصرف شود.
همراه با غذا مصرف شود.

موارد مصرف:

• سرطان سینه پیشرفته یا متاستاتیک، HR مثبت و HER2 منفی

مزایای رقابتی:

پالبوسیکلیب با مهار CDK4 و CDK6، که نقش مهمی در تکثیر سلول های سرطانی دارند، به طور مؤثری رشد و تکثیر سلول های سرطانی پستان را کنترل می کند. این دارو به طور خاص در بیماران مبتلا به سرطان پستان HR مثبت و HER2 منفی که به درمان های قبلی پاسخ نداده اند، کارایی بالایی نشان داده است. ترکیب پالبوسیکلیب با هورمون درمانی، اثربخشی بالاتری در کنترل بیماری دارد و زمان بقا بدون پیشرفت (PFS) بیماران را به طور چشمگیری افزایش می دهد. پروفایل ایمنی قابل قبول این دارو و توانایی کنترل بهتر بیماری، آن را به یک انتخاب مطلوب برای بیماران مبتلا به سرطان پستان پیشرفته تبدیل کرده است

